

## PRESENTACIONES COMERCIALES

RIXATHON® 100mg SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION	Reg. INVIMA	2020MBT-0000017
RIXATHON® 500mg SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION	Reg. INVIMA	2020MBT-0000017

**Indicaciones:** Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con LNH de células B indoloro, en recaída o resistencia a la quimioterapia. Rituximab en combinación con CHOP para tratamiento de pacientes con linfomas con células B grandes. Tratamiento de primera línea en pacientes con Linfoma no Hodgkin indolente de células B, en combinación con quimioterapia a base de CVP. Rituximab en asociación con metotrexate en el tratamiento de la artritis reumatoidea activa. Terapia de mantenimiento con LNH folicular que hayan respondido al tratamiento de inducción. Tratamiento en primera línea de la leucemia linfocítica crónica (LLC) en asociación con quimioterapia. Rituximab en asociación con quimioterapia para tratamiento de leucemia linfocítica crónica (LLC) recidivante o refractaria. Tratamiento de la vasculitis activa grave asociada a ANCA (anticuerpos anticopasma de los neutrófilos) en combinación con glucocorticoides.

**Contraindicaciones:** No tome Rixathon® si: Es alérgico al rituximab, otras proteínas similares al rituximab, o cualquier otro ingrediente de este medicamento. Tiene una infección activa grave en el momento. Tiene un sistema inmune débil. Tiene una falla cardíaca grave o una enfermedad cardíaca grave no controlada y tiene artritis reumatoide, poliangitis granulomatosa o poliangitis microscópica.

**Precauciones y advertencias:** Hable con su médico, personal de enfermería o farmacéutico antes de que le administren Rixathon® si: Alguna vez tuvo, o puede tener ahora, una infección por hepatitis. Esto es porque en algunos casos, Rixathon® podría causar que la Hepatitis B vuelva a activarse, lo que puede ser mortal en algunos casos raros. Los pacientes que alguna vez han tenido infección por Hepatitis B serán revisados cuidadosamente por su médico para detectar señales de esta infección.

Si alguna vez ha tenido problemas cardíacos (como angina, palpitaciones o insuficiencia cardíaca) o problemas de respiración. Si alguna de las situaciones anteriores se aplica en su caso (o no está seguro), hable con su médico, personal de enfermería o farmacéutico antes de que le administren Rixathon®. Su médico tal vez deba brindarle cuidados especiales durante su tratamiento con Rixathon®. Si padece de artritis reumatoide, poliangitis granulomatosa o poliangitis microscópica también dígaselo a su médico. Si cree que puede tener una infección, incluso una leve como un resfriado. Las células afectadas por Rixathon® ayudan a combatir la infección y debe esperar hasta que la infección haya pasado antes de recibir Rixathon®.

También cuénteles a su médico si tuvo muchas infecciones en el pasado o sufre de infecciones graves. Si cree que puede necesitar vacunas en el futuro cercano, incluidas las vacunas necesarias para viajar a otros países. Algunas vacunas no deben administrarse en el mismo momento que Rixathon® o en los meses posteriores al uso de Rixathon®. Su médico verificará si debe recibir alguna vacuna antes de recibir Rixathon®. Niños y

adolescentes: Hable con su médico, personal de enfermería o farmacéutico antes de recibir este medicamento si usted, o su hijo/a, son menores de 18 años. Esto es porque no existe mucha información sobre el uso de rituximab en niños y jóvenes.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar a temperatura entre 2 y 8°C en su envase y empaque original. La solución en NaCl 0,9% puede almacenarse hasta por 30 días a temperatura entre 2-8°C; la solución en Glucosa 5% puede almacenarse hasta por 24h entre 2-8°C.

**Referencia:** 2020028508

**Fecha de  
Distribución:** 28-Ago-2020

#### **NOTA**

Los medicamentos deben conservarse fuera del alcance de los niños.

Antes de proceder a la prescripción, sírvase leer por completo la información respectiva.

Si desea reportar un evento adverso ingrese al siguiente link: <https://pvi1j.solutions.iqvia.com/pvi-web/> o a través del correo electrónico: [adverse.event.colombia@sandoz.com](mailto:adverse.event.colombia@sandoz.com) .

#### **Pharmalab PHL Laboratorios S.A.S.**

Calle 85ª #28b -34

PBX 621 5380

Bogotá, D.C.

® = Marca registrada